



RECOMENDAÇÕES DE USO:

CULTURAS	DOSAGEM g/ha (por aplicação)	RECOMENDAÇÕES
Algodão	70	Aplicar no estágio de 4 a 6 folhas.
Amendoim	70	Aplicar no estágio vegetativo antes do florescimento.
Batata	140	Aplicar no estágio vegetativo, antes do início da tuberação.
Café	140	Realizar 3 aplicações: pós-colheita (pelo menos 21 dias antes da abertura da flor), no início do crescimento dos grãos (chumbinho) e 45-60 dias após a segunda aplicação.
Cana-de-açúcar (maturação precoce)	70	Aplicar no início do desenvolvimento, com mais de 90% de perfilhamento.
Cana-de-açúcar (maturação média e tardia)	100	Aplicar no início do desenvolvimento, com mais de 90% de perfilhamento.
Citros	140	Realizar 3 aplicações: pós-colheita/pré-florescimento, no início do crescimento dos frutos e 45-60 dias após a segunda aplicação.
Frutíferas	140	Realizar 3 aplicações: uma logo após a colheita (antes da poda e/ou florescimento); pós-florescimento; início do desenvolvimento dos frutos.
Feijão	70	Aplicar no estágio vegetativo antes do florescimento.
Fumo	140	Realizar 3 aplicações. No viveiro: uma aplicação após o repique (30g/100 litros água). A campo: aplicar 21 e 42 dias após o transplante.
Hortaliças Folhosas	140	Realizar 3 aplicações. Na bandeja: uma 5 dias após emergência e outra, 1 dia antes do transplante (30g/100 litros água). No campo: aplicar 7 a 10 dias antes da colheita.
Milho	35	Aplicar no estágio vegetativo (V6).
Soja	70	Aplicar no estágio vegetativo (V4).
Tomate	140	Realizar 3 aplicações. Na bandeja: uma 5 dias após emergência e outra 1 dia antes do transplante (30g/100 litros água). No campo: aplicar no início do florescimento.
Trigo	35	Aplicar durante o estágio vegetativo, após o início do perfilhamento.

MODO DE APLICAÇÃO: Recomenda-se a aplicação do produto em jato dirigido às folhas da cultura e o uso de bico cone cheio, visando assegurar que a dose do produto seja efetivamente utilizada pela cultura.

PREPARO DA CALDA: Antes de verter este produto no tanque de pulverização, recomenda-se fazer uma pré-diluição na base de 1 g de produto / 3 ml de água.

VOLUME DE CALDA: 100 a 200 l/ha

INTERVALO MÍNIMO ENTRE APLICAÇÕES: 21 dias